

# Sarna o Escabiosis

Enfermedad de la piel producida por el ácaro Sarcoptes Scabiei.

## SÍNTOMAS



### 1. PRURITO O PICOR INTENSO que se agrava a las noches

(1ª Infección: tras 2 - 6 semanas del contacto.

Reinfección: tras 1 - 4 días del contacto)

### 2. ERUPCIONES EN LA PIEL DE SIMÉTRICA INEXPLICABLE

(en adultos: entre los dedos, manos, muñecas, axilas, pezones, nalgas y genitales,...)

### 3. SURCOS Y OTRAS LESIONES EN DIFERENTES PARTES DEL CUERPO


## CONTAGIO



**DE PERSONA A PERSONA**  
(tras contacto directo y prolongado con la piel)



**POR TEXTILES**  
(ropa, sabanas, toallas...)



**POR SUPERFICIES, MUEBLES, ETC.**  
(El ácaro puede vivir fuera del cuerpo humano hasta 48-72 horas)



**DE ANIMAL A PERSONA**  
(posible pero improbable)

## MEDIDAS DE ACTUACIÓN

- Consultar con el médico de cabecera y seguir sus instrucciones.
- Recibir tratamiento tanto la persona infectada como los contactos directos.
- Lavar prendas de vestir y ropa a 60º.
- Guardar los textiles que no se pueden lavar en bolsas de plástico herméticas al menos durante 4 días.
- Extremar medidas de higiene.
- Generalmente, trascurridas unas horas tras la primera aplicación del tratamiento ya no es contagioso y se puede llevar una vida normal.



mutualia

Asesoría de Prevención  
[prevencion@mutualia.eus](mailto:prevencion@mutualia.eus)

[www.mutualia.eus](http://www.mutualia.eus)



Plan de actividades preventivas de la Seguridad Social