





ZER EGIN BEHAR DUT? ODOLJARIOA GELDITU



Estutu zuzenean zauriaren gainean gaza esteril edo oihal garbi batekin. 5-10 minutuz.




Gorputz-adarra altxa.



Odoljarioria baloratu. Gazak bustita badaude, ez kendu. Jarri gaza gehiago gainean eta jarraitu presioa egiten.

ZER EZ DUT EGIN BEHAR?



Ez egin torniketerik.




Ez utzi zauria agerian edota gainean putz egin.



Ez atera zauritik objekturik.



Ez estali zauria zuzenean kotoiarekin edo hari solteak dituzten oihalekin.



Ez jarri krema eta pomadarik.



Ez jarri izotza zuzenean zauriaren gainean.

KONTUAN IZATEKO

Mutualiako zure zentrorik hurbilenera joan. Hurrengo zauriek lehen arreta ez atzeratzea eskatzen dute:

- Zaurian konpresioa egin ondoren odolotan jarraitzen badu edota odola zurrustaka ateratzen bada.



- Zauria zabala, handia edota sakona bada.



- Zauriak aurpegian, ezpainetan, lepoan edota genitaletan eragina badu.




- Zauriak barruan objektu bat badu edo izan badezake (ikusteko modukoa izan ala ez).

- Zauria objektu zikin edo herdoildu batek eragin badu.



- Gunean sentikortasuna edo funtzioa galtzen bada.

- Hozkada bat denean (animalia edota gizakiarena).



- Substantzia galtzen bada edo anputazioa gertatzen bada.